



1.

ORNITHOLOGISCHER SAMMELBERICHT 1997 FÜR DEN KREIS LIPPE

K. e. b. L. 1.6

Lippische Landesbibliothek



06266105

Zs 2958.11^o. 1997

 ORNITHOLOGISCHER SAMMELBERICHT 1997 FÜR DEN KREIS LIPPE

**STERNTAUCHER** (*Gavia stellata*)

11. + 12.11.1997 1 immat., Emmerstausee (BS/HM)

26.10.1965

ZWERGTAUCHER (*Tachybaptus ruficollis*)

Zahlreiche Beobachtungen vom Emmerstausee, an den Abbaugeländen an der Rethlake bei Lage/Müssen, von der Weser und vom Norderteich.

Am Norderteich wurden 2 Brutpaare mit je 3 Jungtieren festgestellt.

Das Maximum außerhalb der Brutzeit wurde am 14.9. und am 19.9.1997 mit 6 Tieren festgestellt.

KORMORAN (*Phalacrocorax carbo*)

Beobachtungen vom Emmerstausee, vom Abbaugelände Rethlake/Müssen, vom Mühlenbruch bei Orbke, vom Meschensee bei Detmold, vom Norderteich und von der Weser wurden gemeldet. Das Maximum waren dabei ca. 100 Exemplare auf der Weser im Winterhalbjahr 1996/1997 (AG Kalletal). Das Max. am Norderteich lag am 1.4.1997 bei 7 Ex.

GRAUREIHER (*Ardea cinerea*)

Neben der bekannten Kolonie in Erder (1997: 88 besetzte Horste, AG Kalletal) wurde eine zweite, kleine Kolonie am Vogelpark in Heiligenkirchen bekannt. Aus 3 Horsten flogen hier Jungvögel aus. Nach Aussage des Vogelparkbetreibers und Beobachtungen von HM sind dies reine Wildvögel.

WEIßSTORCH (*Ciconia ciconia*)

4.5.1997 1 Ex zwischen Blomberg/Istrup und Wendlinghausen (FM)

SCHWARZSTORCH (*Ciconia nigra*)

Im Bereich Extertal sind 1997 mind. 2 Brutreviere bekanntgeworden. Ein drittes wird hier vermutet. Die vermuteten Brutpaare im Bereich Schwalenberger Wald und bei Dalborn konnten in diesem Jahr nicht nachgewiesen werden.

10.4.1997 1 Ex über Fromhausen in Richtung Horn ziehend (KHS)

6.5.1997 1 Ex über Papiermühle in Schieder (EB)

SAATGANS (*Anser fabalis*)

Winter 1996/1997 4 Ex im Weserbereich (AG Kalletal)

GRAUGANS (*Anser anser*)

Bruten am Emmerstausee (5 juv, BS), am Norderteich (2 Brutpaare mit insges. 5 juv, HM) und Stemmen (ca. 50 ad+juv im Juni 1997, AG Kalletal)

WEIßWANGENGANS (*Branta leucopsis*)

Winterhalbjahr 1996/1997 1 Ex im Weserbereich (AG Kalletal)

STREIFENGANS (*Anser indicus*)

Winterhalbjahr 1996/1997 2 Ex im Weserbereich (AG Kalletal)

Status in Mitteleuropa: Gefangenschaftsflüchtling, Bruten sind schon bekannt geworden.

PFEIFENTE (*Anas penelope*)

19.9.1997 2 Ex, Norderteich (HM)

21.10.1997 3/8, Norderteich (HM)

9.11.1997 0/2, Norderteich (HM)

Im Weserbereich (AG Kalletal)

SCHNATTERENTE (*Anas strepera*)

1.4.1997 1/1, Norderteich (HM)

6.4.1997 1/1, Norderteich (HM)

19.9.1997 2 SK, Norderteich (HM)

23.9.1997 0/1, Norderteich (HM)

SPIEßENTE (*Anas acuta*)

17.4.1997 0/1, Norderteich (HM)

Einige Exemplare an der Weser (AG Kalletal)

April 1997: Brutverdacht bei Blomberg/Maspe (R.H, mitteil. durch FM)

LÖFFELENT (*Anas clypeata*)

Insgesamt 17 Beobachtungstage am Norderteich.

Frühjahrsbeobachtungen: 23.3.1997 bis 8.6.1997,

dabei Maximum am 1.4.1997: 6/5 (HM)

Herbstbeobachtungen vom 28.8.1997 bis zum 21.10.1997, Max. dabei am 14.9.

und am 17.9.1997: 21 SK (HM)

Außerdem Sichtungen im Abbaugelände Müssen (5.9.1997: 1 SK) und am

Emmerstausee (17.3.1997: 1/1, 10.5.1997: 1/0, beides BS)

KRICKENTE (*Anas crecca*)

Max am Norderteich: 23.3.1997: 6/5 (HM). Außerdem beobachtet am

Emmerstausee, am Postteich (Detmold), am Haverkampsee (Schlangen)

(2 immat vom 15.9.1997 bis zum 22.9.1997) und an der Weser.

KNÄCKENTE (*Anas querquedula*)

23.3.1997 3 Ex, Norderteich (UK)

25.3.1997 2/1, Emmeraltarm nördl. Harzberg (BS)

Frühjahr 1997 1/1, Feuchtgebiet am Königsbach, Blomberg (RH mündl.)

TAFELENTE (*Aythya ferina*)

Zahlreiche Daten:

Norderteich: Max. 5 am 8.3.1997, 23.3.1997 und 1.9.1997

Emmerstausee: über 200 (BS)

Abbaugbiet Müssen/Rethlake: Max. 22 am 14.2.1997

REIHERENTE (*Aythya fuligula*)

Im Abbaugbiet Rethlake/Müssen bis zu 33 Exemplare (14.2.1997)


Über 200 Tiere waren am 20.2.1997 auf dem Emmerstausee zu sehen (BS)

Zur Abbildung:

Verteilung der Reiherente am Norderteich. Am 9.11.1997 war die Wasserfläche für das bevorstehende Abfischen bereits zu 50% reduziert worden.

Damit war der Wasserstand zu gering für Tauchenten.

Eine Brut konnte wieder nicht nachgewiesen werden.



EIDERENTE (*Somateria mollissima*)

Winterhalbjahr 1996/1997: 1 Ex im Weserbereich (AG Kalletal)

SCHELLENTE (*Bucephala clangula*)

9.3.1997 0/2, Norderteich (UK)

ZWERGSÄGER (*Mergus albellus*)

22.2.1997 1/0, Emmerstausee (HM, EB et al)

GÄNSESÄGER (*Mergus merganser*)

Letzte Beobachtung auf dem Emmerstausee am 17.3.1997 mit 44 Tieren (BS)

Hier das Max. bei ca. 80 Gänsesägern im Februar.

Weitere Beobachtungen: Abbaugbiet Rethlake/Müssen: 0/1 am 12.1.1997 (HM)
und 0/6 am 13.12.1997 (HM)

Weserbereich: 6 Ex im Winterhalbjahr 1996/1997 (AG Kalletal)

SCHWARZMILAN (*Milvus migrans*)

17.3.1997 1 Ex, Emmerstausee (BS)

1.4.1997 1 Ex, Norderteich (HM)

4.4.1997 1 Ex, Norderteich (UK)

28.4.1997 1 Ex, Emmerstausee (BS, mündl. Nesen-Höhner)

10.5.1997 1 Ex, Emmerstausee (BS)

28.6.1997 1 Brutpaar, südl. Blomberg (Frau Müller mündl.)

WIESENWEIHE (*Circus pygargus*)

4.9.1997 1/0 hoch durchziehend, Norderteich (HM)

KORNWEIHE (*Circus cyaneus*)

1.4.1997 1/0 durchziehend, Mörth (HM)

ROHRWEIHE (*Circus aeruginosus*)

6.4.1997 0/1, Norderteich (KHS/HM)

9.4.1997 1/0, Norderteich (HM)

17.4.1997 0/1, Norderteich (HM)

23.4.1997 0/1, Norderteich (HM)

6.5.1997 Brutverdacht im Abbaugbiet Stemmen (BS)

6/1997 Brutverdacht in Stemmen kann nicht bestätigt werden (BS)

WESPENBUSSARD (*Pernis apivorus*)

8.6.1997 1 Ex, Externsteine überfliegend und im Wald nahe L828 landend (HM)

27.6.1997 1 Ex, Lattberg zwischen Eversen & Entrup (Kreis Steinheim /
nahe Grenze Kreis Lippe) (TK/HM)

8.7.1997 Brutverdacht, Lügde/Bierberg (BS)

20.8.1997 1 Ex durchziehend, Dörenschlucht/Augustdorf (HM)

FISCHADLER (*Pandion haliaetus*)

- 17.4.1997 1 Ex durchziehend, Norderteich (HM)
10.9.1997 1 Ex, jagend, NSG Salkenbruch (HM)

BAUMFALKE (*Falco subbuteo*)

- 5/97 1 Ex im Flug, Detmold/Nähe Freilichtmuseum (FM)
17.5.1997 1 Ex, Norderteich (UK)
Im Gebiet südlicher Teutoburger Wald (Fürstlicher Forstteil)
sicher vorkommend (KHS mündl.)

REBHUHN (*Perdix perdix*)

- Kaum Meldungen, hoffentlich doch häufiger...
11.5.1997 1 Ex, Hohenhausen (AG Kalletal)
25.6.1997 1 Ex, rufend, Industriegebiet Jerxen-Orbke (HM)

WACHTEL (*Coturnix coturnix*)

- Wie in vielen anderen Regionen auch, gab es bei uns in Lippe überdurchschnittlich viele Meldungen:
27.6.1997 verhört, Gebiet Hilgenstock zwischen Vinsebeck und Steinheim (TK/HM)
verhört, Lattberg zwischen Eversen und Wendlinghausen (TK/HM)
30.6.1997 rufend, zwischen Herrentrup und Tintrup (KB)
7/1997 rufend, zwischen Vossheide und Wendlinghausen (FM)
2.8.1997 2 rufend, zwischen Lothe & Ruensiek (EB)
8/1997 rufend, Wellenweg in Wehren (KB)
6.8.1997 1 rufend, str. von Lothe nach Schwalenberg, Abzw. Modellflugplatz (EB)

WACHTELKÖNIG (*Crex crex*)

Über den Sommer am Waldcafe bei Heiligenkirchen verhört (Dr. Schmincke mündl.)

WASSERRALLE (*Rallus aquaticus*)

- Brutverdacht für etwa 3 Paare am Norderteich (UK)
17.9.1997 1 Sichtvermerk, Norderteich (HM)

FLUßREGENPFEIFER (*Charadrius dubius*)

- 2.5.1997 ✓ 3 Ex (Brutverdacht), Klärbecken Lage (KHS)
10.5.1997 Brutverdacht auf Insel am Emmerstausee (BS)
11.6.1997 2 Ex, Emmerstausee (BS)
2.7.1997 Brutverdacht, Kompostwerk Lage-Hölsen (BS/WD)
12.7.1997 ✗ 4 Ex, Meschensee (KHS)
2.8.1997 ✓ 4 Ex, Klärbecken Lage (KHS)
2 Brutpaare in Vahrenholz/Weser (AG Kalletal)
20.9.1997 1 Ex, Haverkampsee/Schlangen (HM)
22.9.1997 1 Ex, Haverkampsee/Schlangen (HM)
-

KIEBITZ (*Vanellus vanellus*)

Nur wenige Meldungen, die wohl nicht vollständig sind...

Es wurden ausschließlich Zugzeitbeobachtungen gemeldet. Lediglich aus dem Bereich Flugplatz Detmold gibt es eine Brutzeitbeobachtung (FM)

UFERSCHNEPFE (*Limosa limosa*)

5.9.1997 2 Ex rastend, Klärbecken Lage (KHS)

24.9.1997 1 Ex, rufend mehrmals am Südhang des Teutoburger Waldes entlangfliegend, Truppenübungsplatz Senne, Prinz-Regentenstein (BS)

GRÜNSCHENKEL (*Tringa nebularia*)

24.9.1997 1 Ex, Rethlake/Müssen (HM)

FLUßUFERLÄUFER (*Actitis hypoleucos*)

26.5.1997 -1 Ex, Norderteich (HM)

2.8.1997 ✓2 Ex, Rast, Meschensee (KHS)

24.8.1997 ✓1 Ex rastend, Schloßgraben Detmold (KHS)

28.8.1997 -1 Ex, Norderteich (HM)

5.9.1997 ✓2 Ex, Klärbecken Lage (KHS)

11.9.1997 -1 Ex, Haverkampsee/Schlangen (HM)

15.9.1997 -2 Ex, Haverkampsee/Schlangen (HM)

18.9.1997 ✓6 Ex, Haverkampsee/Schlangen (HM)

26.9.1997 1 Ex, Abbaugelände Rethlake/Müssen (HM)

2-3 Ex im Frühjahr & Sommer am Norderteich (UK)

WALDWASSERLÄUFER (*Tringa ochropus*)

12.11.1997 1 Ex, Emmerstausee (BS)

WALDSCHNEPFE (*Scolopax rusticola*)

4.11.1997 7 Ex, NSG Salkenbruch, bei Treibjagd aufgescheucht (mündl. an BS)

TRAUERSEESCHWALBE (*Chlidonias niger*)

17.9.1997 1 diesjähriges Exemplar, Norderteich (HM)

HOHLTAUBE (*Columba oenas*)

9.6.1997 südl. Hartröhren rufend (BS)

19.7.1997 östl. des Emmerstausees am Steilhang des Kleffs, nördl. von Harzberg rufend (BS)

Zur Brutzeit gehört, Kanzel, Uffler, Heidental (HS)

2 Paare zur Brutzeit, Südhang Teutoburger Wald (Fürstlicher Forst) (KHS)

TURTELTAUBE (*Streptopelia turtur*)

Brutzeitbeobachtung im Furlbachtal und bei Leopoldstal (HS)

1 Ex in Heidelbeck verhört (AG Kalletal)

Beobachtung auf dem Möllenberg zwischen Billerbeck und Norderteich (UK)

KUCKUCK (*Cuculus canorus*)

Je 1 Ex konnte festgestellt werden in folgenden Orten:

Norderteich (HS/HM), Blomberg (HS), Bentorf, Hellinghausen,

Hohenhausen, Stemmen, Varenholz (alles AG Kalletal)

3 Ex wurden im Bereich zwischen dem Südhang des Teutoburger Waldes und der Senne beobachtet (KHS)

SCHLEIEREULE (*Tyto alba*)

1 Brutpaar, Bentorf (AG Kalletal)

1 Brutpaar, Faulensiek (AG Kalletal)

1 Brutpaar, Heidelbeck (AG Kalletal)

2 Brutpaare, Hohenhausen (AG Kalletal)

1 Totfund in Osterhagen (AG Kalletal)

1-2 Bruten in Billerbeck (UK)

UHU (*Bubo bubo*)

10.3.1997 mehrere Nächte rufend in Brakelsiek (Niederkrüger)

7.4.1997 Totfund zwischen Schwalenberg und Kollerbeck,
nahe des Kreienberges.

Genauere Todesursache soll untersucht werden (BS)

Nach der Brutzeit verhört: Am kahlen Ehberg
(NSG Donoper Teich / Hiddeser Bent) (HS)

Weitere Daten liegen der Arbeitsgruppe Ornithologie vor,
werden aber aus Artenschutzgründen nicht bekanntgegeben.

BIENENFRESSER (*Merops apiaster*)

Nach 1996 wieder eine Brut im Kreis Lippe. 2 Brutpaare in den Sandgruben
„Hengstheide“ (Lemgo/West)

4 Jungvögel flogen dabei aus. Da max. 12 Tiere gesichtet wurden,
kann von mind. 4 Helfern ausgegangen werden. (WD u.v.a.)

SCHWARZSPECHT (*Dryocopus martius*)

Je 1 Ex wurden aus Asendorf, Dalbke, Heidelbeck, Hohenhausen und Kalldorf
gemeldet (AG Kalletal)

Mehrere dagegen „tummeln“ sich im ganzen geschlossenen Waldgebiet des
Teutoburger Waldes. (KHS)

1.3.1997 1 Ex am Rotenberg (Detmold) (KHS)

4/1997 1 Ex, Leistruper Wald (KHS)

GRÜNSPECHT (*Picus viridis*)

1 Ex in Asendorf gesichtet (AG Kalletal)

20.4.1997 1 Ex ruft in Alteichen am Norderteich (UK)

KLEINSPECHT (*Dendrocopos minor*)

Für einen typischen Brutvogel des Tieflandes überraschend viele Beobachtungen:

24.4.1997 1 rufendes und trommelndes Männchen, Oetternbach, Lage,
Höhe Oetternsiedlung

1996 zwischen Heiden und Lieme mind. 4 Paare entlang des Oetternbaches (BS)
1 Ex jeweils in Asendorf und Langenholzhausen gesichtet (AG Kalletal)

WIESENPIEPER (*Anthus pratensis*)

Am Vahlhausener Friedhof bei Horn ab 26.5.1997 mehrere Tage
im Singflug beobachtet (UK)

NACHTIGALL (*Luscinia megarhynchos*)

14.5.1997 1 Ex singend, Kreuzung Eisenbahnlinie Lage-Bielefeld
und Werre (WD)

14.5.1997 1 Ex singend, Wirtschaftsgebäude bei Gut Iggenhausen (WD)

28.5.1997 1 Ex singend, NSG "Teich bei Wöbbel" (BS)

GARTENROTSCHWANZ (*Phoenicurus phoenicurus*)

3.5.1997 1 Ex rastend am Schieferberg/Diestelbruch (KHS)

5/1997 Beobachtet in Blomberg/Cappel (FM)

6 & 7/1997 1/0 im Bereich Knochenbach/Braunenbruch (Detmold) (GA)

BRAUNKEHLCHEN (*Saxicola rubetra*)

13.5.1997- 6.6.1997 Brutverdacht im Begatal zwischen Brake und Voßheide (FM)

5/1997 Beobachtet bei Blomberg/Wöhren (FM)

6/1997 1 Brut bei Großenmarpe (R.H. mündl.)

SCHWARZKEHLCHEN (*Saxicola torquata*)

20.4.1997 1/0 in Westorf (AG Kalletal)

SCHAFSTELZE (*Motacilla flava*)

Ab 9.4.1997 bis Ende Mai ziehend in Langeloh/Heidenoldendorf (UK)

FELDSCHWIRL (*Locustella naevia*)

18.7.1997 2 singend, NSG Salkenbruch (BS)

Je 1/0 verhört in: Bentorf, Henstorf, Hohenhausen, Varenholz (AG Kalletal)

2/0 singend, Norderteich (UK)

TEICHRÖHRSÄNGER (*Acrocephalus scirpaceus*)

- 16.5.1997 4/0 singend, Abbauggebiet Stemmen (BS)
11.6.1997 1/0 singend, Emmerstausee (BS)

BEUTELMEISE (*Remiz pendulinus*)

Mit der Beutelmeise hält ein neuer Brutvogel im Kreis Lippe Einzug.
Im Zuge der derzeitigen Ausbreitung Richtung Westen sind hier in den kommenden Jahren noch weitere Bruten in Lippe zu erwarten.
3 Brutpaare in Stemmen und Varenholz (AG Kalletal)

NEUNTÖTER (*Lanius collurio*)

Folgende Daten liefen in diesem Jahr ein:

- 17.5.1997 0/1, Siekbachtal/Extertal (HM)
3 Brutpaare bei Hornoldendorf (KHS/HM)
1 Brutpaar, Schieferberg/Detmold (KHS)
1 Brutpaar an L828 auf Höhe der Externsteine (HM)
Ca. 50% der Fläche im Kalletal wurden systematisch untersucht:
1/0 Einzelvogel, 12 Brutpaare, 12 Brutpaare mit juv (AG Kalletal)
20.6.1997 1/0, südl. Remmighausener Berg (KHS)
Neue Plätze in Cappel, Lothe, Blomberg/Hagendonop
und Brokhausen entdeckt (FM)
6-7 Brutpaare, Bellenberg bei Horn (UK)

RAUBWÜRGER (*Lanius excubitor*)

Leider wieder keine Brut im Kreis Lippe!

- 1 Ex von Januar - März bei Hohenhausen (AG Kalletal)
2 Ex von Januar - April bei Heidelbeck (AG Kalletal)
20.4.1997 Am Biesterberg bei Lemgo gesichtet (FM)
4/1997 Sichtungen bei Lothe (T.Fiene)
5/1997 Beobachtungen bei Barntrop (RH Mitteilung an FM)

TANNENHÄHER (*Nucifraga caryocatactes*)

- 20.8.1997 Beobachtung in Blomberg/Cappel (FM)
2.9.1997 1 Ex, Lothe (EB)
15.9.1997 3 Ex, Lothe (EB)
20.9.1997 1 Ex verhört, Detmold Innenstadt (HM)

Im Sommer regelmäßig im NSG Mörth (BS)

Einzelne Beobachtungen im Schling bei Heiligenkirchen/Waldcafe (Dr. Schmincke)

KOLKRABE (*Corvus corax*)

- Seit Mai keine Nachweise mehr im Salkenbruch (BS)
Festgestellt im Raum Oesterholz, Eckelau (HS)
6.9.1997 2 Ex bei Hohenhausen gesichtet (AG Kalletal)
1 Brutpaar mit einem Jungvogel in Asendorf gesichtet (AG Kalletal)
1.3.1997 Im Flug über Blomberg/Cappel (FM)
7/1997 Bei Wiembeck gesichtet, laut Anwohner dort häufig anzutreffen (FM)
12/1997 2 Ex bei Mosebeck/Altenkamp (H.D.Wiesemann)

SAATKRÄHE (*Corvus frugilegus*)

- Ca. 60 Brutpaare bei Wöbbel (HM)
Winterschlafplatz in Pappelwald am Braunenbruch/Detmold (HS/HM)

FICHTENKREUZSCHNABEL (*Loxia curvirostra*)

- 1.7.1997 16 Ex, Salkenbruch von NE in Richtung SW ziehend,
später noch einmal 6 Ex nach NW (BS)

Volz | H.d.
H | BPI r
21 II

ROHRAMMER (*Emberiza schoeniclus*)

- Brutverdacht für 3-5 Paare, Norderteich (UK)

KERNBEISSER (*Coccothraustes coccothraustes*)

- Sommer 1997 Detmold/Neustadt, Allee, 2 juv. fütternd (GA)

**ABKÜRZUNGEN FÜR DIE BEOBACHTER
IN ALPHABETISCHER REIHENFOLGE:**

BS-	KB-
<i>Biologische Station Lippe</i>	<i>K. Brömmelmeier</i>
EB-	KHS-
<i>E. Benning</i>	<i>K.-H. Spilker</i>
FM-	RH-
<i>F. Morgenstern</i>	<i>R. Haase</i>
GA-	TK-
<i>G. Ahlers</i>	<i>T. Koke</i>
HM-	UK-
<i>H. Multhaupt</i>	<i>U. Kuhlmann</i>
HS-	WD-
<i>H. Schierholz</i>	<i>W. Deppe</i>

ALLEN MELDERN SEI HERZLICH GEDANKT!

Status von im Kreis Lippe nachgewiesenen Vogelarten nach der „Roten Liste der Brutvögel in Nordrhein-Westfalen“

(Stand: Oktober 1996 nach CHARADRIUS 33, Heft 2/1997)

Die nachfolgende Liste soll der Orientierung dienen. Aus ihr geht hervor, wie die aktuelle Bestandssituation der vorkommenden Vogelarten in NRW ist und wodurch sie gegebenenfalls gefährdet sind.

Den Angaben liegt die „Rote Liste“ der beiden ornithologischen Verbände Nordrhein-Westfalens (GRO und WOG) zugrunde.

Abkürzungen:

a1, a2 usw: Kriterien der Einstufung nach dem Kriterienschema (siehe Anhang)

N Von Naturschutzmaßnahmen abhängig

BP Brutpaar/e, Brutten oder Reviere

rM revieranzeigende Männchen

GF Mögliche Gefährdungsursachen:

B Biozidbelastung (Insektizide, Herbizide, Sekundärvergiftungen)

F Störungen durch Freizeitaktivitäten (Badebetrieb, Wasser-, Winter-, Kletter-, Flug-, Modellflug-, Angel-, Golfsport und andere touristische Aktivitäten)

L Lebensraumvernichtung und -veränderung (Intensivierung der Land-, Forst und Fischereiwirtschaft, Entwässerung, Eutrophierung, Bebauung, Versiegelung)

V Menschliche Verfolgung in NRW
(Abschuß, Fang, Aushorstung, Zerstörung der Brutplätze, Vergrämung)

Z Verluste auf dem Zug und im Winterquartier (Abschuß, Fang, Biozide, klimatische Faktoren, Lebensraumzerstörung und -veränderung)

Anmerkung zur Kategorie:

0 - Ausgestorben oder verschollen

1 - Vom Aussterben bedroht

2 - stark gefährdet

3 - Gefährdet

R - Arten mit geografischer Restriktion in Deutschland

V - Arten der Vorwarnliste

N - Von Naturschutzmaßnahmen abhängig

Art	Kriterium	GF	BP	Kategorie
<u>Zwergtaucher</u>	b3, Risiko 2	L	250-300	2
Kormoran		V	ca.250	R(N)
<u>Graureiher</u>		V	2.400	N
<u>Schwarzstorch</u>	c2, Risiko 3	L,Z	30-35	2
Weißstorch	a1,a2	L,Z	7	1
Streifengans	Gefangenschaftsflüchtling mit (selten) Brut			
Schnatterente		L	50-60	R
<u>Spießente</u>	Zugvogel mit europaweiter Gefährdung			
Knäckente	a1,a2	L,Z	< 40	1
Löffelente	b1,b2	L,Z	< 100	2
Krickente	c2, Risiko 1&2	L,Z	< 200	2
<u>Tafelente</u>	c2, Risiko 2	L,Z	< 50	2
<u>Wespenbussard</u>	b3	Z	250-350	3(N)
<u>Schwarzmilan</u>		L,Z	10-20	R
Rohrweihe	c2, Risiko 2	L,V,Z	170-190	2(N)
Wiesenweihe	c2, Risiko 1&2	L,Z	45	1(N)
<u>Rotmilan</u>	b3, Risiko 2	B,F,Z	350-400	2(N)
<u>Baumfalke</u>	b3	V,Z	350-500	3(N)
<u>Habicht</u>		V	1500-1900	N
<u>Sperber</u>		V	3200-3600	N
Fischadler	Zugvogel mit europaweiter Gefährdung			
<u>Rebhuhn</u>	a4, Risiko 2	L,V	8000-12000	2(N)
<u>Wachtel</u>	b3, Risiko 2	L,Z	200-1000 rM	2
<u>Wasserralle</u>	b2	L,Z	160-200	2
<u>Wachtelkönig</u>	a2	L,Z	60-110 rM	1
Flußregenpfeifer	c3, Risiko 2	F,L	400-600	3
<u>Kiebitz</u>	a4	L,Z	12000-16000	3
<u>Waldschnepfe</u>	b4			V
Uferschnepfe	b3, Risiko 1	L,Z	370	2
Flußuferläufer	Seit 1986 in NRW verschollen			

Art	Kriterium	GF	BP	Kategorie
Trauerseeschwalbe	a1 ,a2	L	1-2	1
<u>Hohltaube</u>		L	4000-5000	N
<u>Turteltaube</u>	b4, Risiko 2	L,Z	5000-10.000	3
<u>Kuckuck</u>	b4			V
<u>Uhu</u>	c2, Risiko 2&3	B,F	60-80	3(N)
<u>Schleiereule</u>		B,L	2500	N
<u>Waldohreule</u>	b4			V
<u>Bienenfresser</u>			1	R
<u>Grünspecht</u>	a4	L	800-1500	3
<u>Schwarzspecht</u>	b4, Risiko 2	L	1000-2000	3
<u>Mittelspecht</u>	b3, Risiko 2	L	500-550	2
<u>Kleinspecht</u>	b4, Risiko 2	L	1200-2500	3
<u>Feldlerche</u>	b4			V
<u>Uferschwalbe</u>	b4, Risiko 2	L,V,F,Z	4000-6000	3(N)
<u>Rauchschwalbe</u>	b4, Risiko 2	L,Z	50.000-80.000	3
<u>Mehlschwalbe</u>	b4			V
<u>Baumpieper</u>	b4			V
<u>Wiesenpieper</u>	a4	L,Z	3000-5000	3
Schafstelze	a4	L,Z	3000-5000	3
<u>Wasseramsel</u>		F	1500-2500	N
<u>Nachtigall</u>	a4	L,Z	4000-6000	3
<u>Gartenrotschwanz</u>	a4	L,Z	2000-4000	3
<u>Braunkehlchen</u>	a3	L	330	2(N)
Schwarzkehlchen	a3	L	300-360	2
<u>Feldschwirl</u>	b4, Risiko 2	L,Z	3000-4000	3
<u>Teichrohrsänger</u>	b4, Risiko 2	L	1500-2000	3
<u>Gelbspötter</u>	b4			V
<u>Klappergrasmücke</u>	b4			V
<u>Dorngrasmücke</u>	b4			V
<u>Beutelmeise</u>		F,L	50-70	R
<u>Neuntöter</u>	c1	L,Z	3000-5000	3
Raubwürger	a1,a2	L,F	60-100	1(N)
<u>Tannenhäher</u>			100-400	R
<u>Dohle</u>	c4, Risiko2			V
<u>Kolkrabe</u>	c2, Risiko 1,2,3	V	31	1
<u>Saatkrähe</u>		V	6600	N
<u>Feldsperling</u>	b4			V
<u>Goldammer</u>	b4			V
<u>Rohrammer</u>	b4			V
<u>Eisvogel</u>	c3, Risiko 1,2	L,F	200-900	3

gelb spötter

Versuch einer Auswertung der „Statusliste für die Vogelarten im Kreis Lippe“

Die in der Liste *fett und kursiv gesetzten, unterstrichenen* Vogelarten wurden im Kreis Lippe während der Brutzeit festgestellt.

Bei der folgenden Auswertung beruft sich der Autor rein auf diese Arten.

a. Aufsplittung der bedrohten Vogelarten nach Kategorien

- **Kategorie 1** (Vom Aussterben bedroht):

Hier sind zwei Vogelarten zu verzeichnen. Der Wachtelkönig konnte durch ein rufendes Männchen festgestellt werden. Ob es hier allerdings zu einer Brut kam ist ungewiß.

Der Kolkrabe konnte wieder an mehreren Stellen nachgewiesen werden. Hier wurden auch erfolgreiche Bruten festgestellt.

- **Kategorie 2** (Stark gefährdet):

Insgesamt neun Arten fallen in diese Kategorie.

Bruten konnten hier beim Zwergtaucher, beim Schwarzstorch, Braunkehlchen und beim Rotmilan nachgewiesen werden.

Ob die Rebhühner, Wachteln, Wasserrallen und Mittelspechte gebrütet haben ist zwar nicht mitgeteilt worden aber höchst wahrscheinlich.

Somit dürfte lediglich die Tafelente als Brutvogel mit Kategorie 2 - Status fraglich sein.

- **Kategorie 3** (Gefährdet)

17 Vogelarten können dieser Kategorie zugeordnet werden.

Hier können leider lediglich 8 Arten als sichere Brutvögel bezeichnet werden.

Die restlichen 9 Arten wurden der Arbeitsgruppe leider nicht als Brutvögel gemeldet.

- **Kategorie N** (Von Naturschutzmaßnahmen abhängig).

Hier sind Überschneidungen mit anderen Kategorien möglich.

Beispiel: Der Uhu ist gefährdet (Kategorie 3) und von Naturschutzmaßnahmen abhängig.

Laut der „Roten Liste NRW“ sind dies bei uns 14 Vogelarten. Der Handlungsbedarf dürfte in Lippe sicherlich unterschiedlich stark sein. So dürfte es der Wasseramsel in weiten Teilen des Kreises Lippe noch ganz gut gehen. Bei anderen Arten wie dem Rebhuhn, dem Braunkehlchen oder der Uferschwalbe hingegen sollten baldmöglichst greifende Naturschutzmaßnahmen in Gang kommen.

- **Kategorie R** (Arten mit geografischer Restriktion in Deutschland)

Hier sind der Schwarzmilan, die Beutelmeise, die Bienenfresser und der Tannenhäher zu finden.

Während der Schwarzmilan und die Bienenfresser immer wieder mal in den verschiedensten Gebieten in NRW als Brutvögel nachgewiesen werden können, kommt die Beutelmeise verstärkt in den östlichen Landesteilen vor. Sie breitet sich von Osten her aus.

Der Tannenhäher dagegen benötigt das bewaldete Mittelgebirge und findet deshalb in den lippischen Höhenzügen gute Brutmöglichkeiten vor.

- **Kategorie V** (Vorwarnliste)

In der Vorwarnliste sind jene Vogelarten zusammengefaßt, deren baldiges Erscheinen in einer der Kategorien 1-3 bei gleichbleibenden Vorraussetzungen wahrscheinlich ist.

In Lippe kommen insgesamt 13 Vogelarten dieser Kategorie während der Brutzeit vor.

b. Aufspaltung der bedrohten Vogelarten nach Gefährdungsursachen

- **Lebensraumvernichtung- und veränderung (L)**

Auch in Lippe ist dies die häufigste Gefährdungsursache.

Nach der aktuellen „Roten Liste NRW“ sind hierdurch 27 lippische Brutvogelarten akut bedroht. Mit 8 Arten sind dabei vor allem die Vögel der Agrarlandschaft am häufigsten vertreten.

Die anderen Lebensräume verteilen sich wie folgt:

Wasservögel (7 Arten), Waldvögel (6 Arten), Vogelarten mit Brutplätzen in menschlichen Siedlungen (Schleiereule und Rauchschnalbe),

Schwarzmilan, Turteltaube, Nachtigall und Gartenrotschwanz lassen sich keiner reinen Landschaftsform zuordnen.

- Verluste auf dem Zug und im Winterquartier (Z)

Von den Brutvögeln des Kreises Lippe sind 18 Arten hiervon akut betroffen. Die Gefahrenquellen sind sehr unterschiedlich.

Bei dem Wespenbussard ist dies z.B. die Verfolgung durch den Menschen.

Beim Gartenrotschwanz spielt vielmehr die Biozidbelastung und die Veränderung des Winterquartiers eine Rolle.

Hier ist der internationale Naturschutz gefragt.

- Menschliche Verfolgung in NRW (V)

Nicht nur auf dem Zug sind die Vögel durch die Verfolgung gefährdet.

Gerade Arten wie Graureiher, Habicht oder Sperber werden nachweislich immer wieder absichtlich von den Menschen in ihrem Bestand gefährdet.

Für Lippe können hier 8 Arten genannt werden.

- Störungen durch Freizeitaktivitäten (F)

Zwar ist der Kreis Lippe kein Winter- oder Klettersportgebiet, dennoch gehen auch bei uns Bestandsrückgänge durch unkontrollierte Freizeitaktivitäten aus.

Hier finden wir 6 Arten in der Statusliste.

- Biozidbelastung (B)

Nachweislich sind Rotmilane, Uhus und Schleiereulen durch eine übermäßige Belastung durch Biozide in ihrem Bestand gefährdet.



Aufruf zur Diskussion!

Wer die vorhergehenden Seiten aufmerksam gelesen hat, wird festgestellt haben, daß sich die Bestandszahlen von NRW nicht immer ohne weiteres auf die Situation im Kreis Lippe übertragen lassen.

(Beispiel: In weiten Teilen Lippes ist die Wasseramsel noch ein „Alleweltsvogel“).

Bei vielen Arten fehlen uns aber leider die genauen Brutzahlen. Für konkrete Naturschutzmaßnahmen sind diese aber durchaus sinnvoll. Die ornithologische Arbeitsgruppe im Kreis Lippe bittet deshalb weiterhin um aktive Mitarbeit beim Sammeln der Daten!



Kriterienschema der Roten Liste der Brutvögel in Nordrhein-Westfalen (nach WITT et al. 1996, verändert)

	Kategorie	verstärkt durch	Risikofaktor
ex Seit 1986 kein regelmäßiges Brutvorkommen oder seit 1992 kein Brutnachweis mehr	→0		
a) →sehr starke Bestandsabnahme (>50%) innerhalb der letzten 25 Jahre			
1 <u>sehr starker Arealverlust</u> oder in >50% der naturräumlichen Untereinheiten 0 oder 1	→1		
2 <u>sehr selten</u> (<100 Brutpaare / Reviere =BP) oder an wenigen Stellen (<10)	→1		
3 <u>selten</u> (<1.000 BP)	→2		→1
4 <u>nicht selten</u>	→3		→2
b) →starke Bestandsabnahme (> 20 %) innerhalb der letzten 25 Jahre			
1 <u>sehr starker Arealverlust</u> oder in >50% der naturräumlichen Untereinheiten 0, 1 oder 2	→2		
2 <u>sehr selten</u> (<100 BP) oder an wenigen Stellen (<10)	→2		→1
3 <u>selten</u> (<1.000 BP)	→3		→2
4 <u>nicht selten</u>	→V		→3
c) →keine deutliche Bestandsabnahme oder Bestandszunahme innerhalb der letzten 25 Jahre			
1 <u>sehr starker Arealverlust</u> oder in >50% der naturräumlichen Untereinheiten mit 0, 1, 2 oder 3 angegeben	→3		
2 <u>sehr selten</u> (<100 BP) oder arealbedingt selten	→R		→2
3 <u>selten</u> (< 1.000 BP) aber weit verbreitet	→+		→3
4 <u>nicht selten</u>	→+		→V

Die Einstufung kann erhöht werden, wenn zusätzliche Risikofaktoren für die jeweilige Art bekannt sind. Dies sind im einzelnen:

- 1 Arten, die in ihrem Bestand stark abhängig sind von speziellen Hilfsmaßnahmen;
- 2 Arten, die in ihrem Bestand oder in Teilen des Bestandes durch gegebene oder

absehbare Eingriffe, d.h. laufende oder geplante Maßnahmen des Menschen gefährdet sind oder gefährdet werden können;

- 3 Arten, die auf wenige Standorte beschränkt sind (meist Koloniebrüter oder Arten in Ausbreitung nach einem Bestandstief).

Wasserampel 83 Jungpauze

v.a. Wotke Sa 22, Hillbad, Tattolb/boipe

Erwangel 28 JT (?); nachgewiesen 9 JT
(parastiefe mind. 20cm)

Festop 15⁰⁰ Stunde Schwarzwald